



## **Galblaas operatie**


Chirurgie Waregem  
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis



## Inleiding

Deze folder geeft uitleg over een galblaas operatie.

Gal is groen gekleurde vloeistof die door de levercellen wordt gemaakt. De functie van gal is het verteren/oplossen van vetten waardoor deze door de darm kunnen worden opgenomen. De galproductie in de lever gaat voortdurend door. De galwegen voeren het gal af. Ze beginnen in de lever, komen vervolgens samen tot een grote afvoerende galweg (ductus choledochus), eindigend in de twaalfvingerige darm (duodenum). De galblaas is een tijdelijke opslagplaats voor gal. In de galblaas wordt aan de gal water onttrokken. De gal dikt daardoor in.



*Afbeelding anatomie galblaas regio*

## Aandoeningen van de galblaas

### *Galstenen*

Storingen in galsamenstelling of belemmeringen in de galafvoer kunnen leiden tot de vorming van galstenen. Galstenen worden vaker bij vrouwen dan bij mannen aangetroffen. Naarmate de leeftijd stijgt komen ze meer voor. Er bestaan geen goede methoden om galstenen te voorkomen. De aanwezige galstenen kunnen de binnenwand van de galblaas beschadigen. Hierdoor kan een galblaasontsteking ontstaan. Galstenen kunnen pijnklachten veroorzaken. Als dit gebeurt is er indicatie om de galblaas te verwijderen. Dit is geen acute operatie.



### *Acute galblaasontsteking*

Acute galblaasontsteking treedt plotseling op. Dit kan op elke leeftijd voorkomen. De ontsteking wordt vaak veroorzaakt door een steen die de afvoergang blokkeert. Bij een acute ontsteking van de galblaas is in principe direct een operatie nodig.

### *Chronische galblaasontsteking*

Chronische galblaasontsteking is een vorm die vaak heel geleidelijk ontstaat. Vaak zijn er galstenen aanwezig. De chronische galblaasontsteking verloopt vaak zonder ernstige problemen. Als er klachten optreden is behandeling mogelijk door het verwijderen van de galblaas.

## **De galblaas operatie**

De galblaas kan op verschillende manieren worden verwijderd. Tegenwoordig wordt de kijkoperatietechniek (laparoscopie) het meeste toegepast. Hierbij worden via 4 kleine sneetjes een camera en instrumenten in de buik ingebracht waarna de galblaas kan worden verwijderd. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om de galblaas via een kijkoperatie te verwijderen, bijvoorbeeld door ernstige vergroeiingen na een ontsteking. Dan zal ervoor gekozen worden om de galblaasverwijdering via 1 grotere snede onder de rechter ribbenboog uit te voeren. Het kan ook gebeuren dat de keuze om een grotere snede te maken tijdens de operatie plaatsvindt, waardoor u wakker wordt met een grotere wonde dan in eerste instantie gepland.

## **Complicaties**

Bij iedere operatie is het mogelijk dat er een complicatie optreedt. Complicaties die bij iedere operatie kunnen optreden zijn bijvoorbeeld een wondinfectie of nabloeding. Bij een galblaas operatie is een specifieke complicatie schade aan de hoofdgalweg. Dit kan als gevolg hebben dat een tweede operatie nodig is. Gelukkig komt dit zeer weinig voor.



## Na de operatie

Een voordeel van de kijkoperatietechniek is dat de wondjes maar klein zijn. Er blijven maar kleine littekentjes over. Meestal hebben patiënten geen last van de wondjes. Wel kan de buik bovenin wat pijnlijk aanvoelen en sommige patiënten hebben een pijnlijk gevoel in de rechter schouder. U mag vaak dezelfde dag weer naar huis alwaar u verder herstelt van de ingreep. Soms is het nodig om een nacht in het ziekenhuis te blijven slapen. Als u thuis bent, dan kunt u medicatie innemen voor eventuele pijn, bijvoorbeeld Paracetamol of Ibuprofen. Overleg met uw arts welke pijnstillers u het best gebruikt in uw situatie.

## Verder herstel

Meestal is het herstel na een galblaasoperatie vlot en zonder grote problemen. De hechtingen lossen vanzelf op, verwijderen is dus niet nodig. Doet u na de operatie wel rustig aan. De eerste paar weken kunt u sneller moe zijn. De wondgenezing vindt plaats gedurende de eerste twee weken na de operatie. Echter, wacht in ieder geval een maand om weer actief te sporten. Na ongeveer een maand komt u terug bij uw chirurg op het spreekuur om te zien hoe het met u gaat en de uitslag van het weefselonderzoek te bespreken.

Indien u thuis toename heeft van pijn of koorts, neem dan direct contact op met het ziekenhuis. Buiten kantooruren is de afdeling Spoed 24 uur per dag bereikbaar.

## Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de ingreep, neem dan contact op met uw behandelend specialist.

## Contact

Secretariaat Chirurgie:	tel. 056 - 62 35 01
Verpleegafdeling C1 Chirurgie:	tel. 056 - 62 38 50
Verpleegafdeling CD1 Chirurgie:	tel. 056 - 62 31 50
Afdeling Spoed:	tel. 056 - 62 31 31

Deze folder is ook verkrijgbaar via: [www.chirurgie-waregem.be](http://www.chirurgie-waregem.be)